

Tolerantietest bij mastocytose

Doel van het onderzoek

Bij mastocytose komt een overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen vaker voor dan normaal. Indien mensen reageren zijn de klachten vaak ook ernstiger. Het doel van het onderzoek is het uitsluiten van overgevoeligheid voor een bepaald medicijn.

Uitvoering van het onderzoek

- U wordt op het dagcentrum verwacht waar het onderzoek plaatsvindt.
- Bij de ontvangstbalie krijgt u een potje om urine in op te vangen. Daarna wordt u door de verpleegkundige opgehaald.
- U levert de urine bij de verpleegkundige in. Dit wordt alleen ingestuurd voor onderzoek als bij u een reactie optreedt na de inname van het medicijn.
- U krijgt een infuus en u wordt aangesloten aan een monitor. Zo kunnen wij u goed in de gaten kunnen houden.
- U krijgt 2 keer een medicijn toegediend in opklimmende dosering met een tussenpoos van 1 uur.
- Mocht u reageren dan moet u opnieuw urine inleveren.
- Als alles goed gaat, mag u twee uur na de laatste inname weer naar huis.
- In totaal duurt het onderzoek ongeveer 4 uur.
- U krijgt eten en drinken aangeboden tijdens uw verblijf op het dagcentrum.
- Tijdens het onderzoek mag u de afdeling niet verlaten.

Als u nog vragen heeft over dit onderzoek kunt u bellen met uw specialist (via 050 3616161) of met het dagcentrum: 050 3613402.