

Longoncologie behandeling NSCLC Nivolumab

2^e lijns bij stadium IV NSCLC. Tot progressie à 2 weken.

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: NIVOLUMAB: 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	inlooptijd	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
							RR, pols, temp		
		00.30	NIVOLUMAB in 100 ml NaCl 0,9%	240 mg	240 mg		filter 0,2 µm		

Verpleegkundige toedien-instructies

- Observeer op infusiereacties.

Achtergrondinformatie behandeling NSCLC Nivolumab

Informatie over de kuur:

- Indicatie: recidief na eerstelijns behandeling gemetastaseerd niet kleincellig plaveiselcelcarcinoom.
- Patiënten van de afdeling longoncologie die Nivolumab krijgen:
 - mogen niet thuis door Certe bloed-geprikt worden; een aantal waarden die de arts wil hebben kunnen niet door Certe geprikt worden,
 - moeten in het UMCG 1,5 uur vóór de poliafspraak bloed laten prikken op het priklab,
 - worden niet op het VPDC voorgelicht maar door verpleegkundig specialist longoncologie Sandra Boelens.

Informatie over het geneesmiddel:

• Nivolumab: humaan monokonaal antilichaam PD- L1. Blokkeert de PD-1 pathway. Hiermee wordt voorkomen dat de PD1 de T-cel-productie stopt. De T-cellen nemen toe in aantal en keren zich tegen de tumorcellen.

• Bijwerkingen:

- Infusiereacties:

- koorts, koude rilling
- hoofdpijn
- huiduitslag
- jeuk
- gewrichtspijn
- bronchospasmen
- hyper- of hypotensie

- Misselijkheid

- Diarree

- Benauwdheid

- Vermoeidheid

- Huiduitslag

- Verminderde eetlust

- Pneumonitis

- Buikpijn

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Patiënten-Informatie uit Doc-portal
- Informatiekaartje uitgereikt door arts