

Longoncologie behandeling NSCLC cisplatine-gemcitabine-necitumumab

dag 8 gemcitabine-necitumumab

1^e lijns behandeling bij stadium IV NSCLC, 4 kuren à 3 weken,
hierna maintenance necitumumab op dag 1 en 8 à 3 weken

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: GEMNEC: 2 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966E	O chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	8		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	GEMCITABINE in 250 ml NaCl 0,9%	1250mg/m ²	mg				
		01:00	NECITUMUMAB in 250 ml NaCl 0,9%		800 mg				

Verpleegkundige toedien-instructies

- Prik het infuus met een roze naald in een grote vene, houd de patiënt warm en bedek de infuusarm met een (fleece)deken. Zie ook document 'pijnlijke infusie cytostatica' op de website van het Dagcentrum > patiëntenzorg > interventies.

anti-emetica thuisadvies:

Zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

Achtergrondinformatie NSCLC Cisplatine – Gemcitabine- Nectinumab dag 8 Gemcitabine-nectinumab

Informatie over de behandeling:

- Indicatie: niet kleincellig longcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom.
- Cisplatine-Gemcitabine-Nectinumab klinisch, daarna Gemcitabine-Nectinumab op dag 8 op het Dagcentrum.
- Evaluatie: na elke 2 kuren

Informatie over het geneesmiddel:

- Gemcitabine: Cytostaticum behorende tot de antimetaboliëten.
- Cisplatine: Cytostaticum behorende tot de platina verbindingen.
- Nectinumab: een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam (tweede generatie) gericht tegen de EGFR-receptor.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – cisplatine/gemcitabine
- Nectinumab: Acneïforme huidreactie (80%), Hypomagnesiëmie. (2x vaker dan bij standaard chemotherapie)

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Gemcitabine kan lichte tot matige slaperigheid/aangeschoten gedrag veroorzaken. Waarschuw de patiënt dat hij slechts deelneemt aan het verkeer of machines gebruikt indien is gebleken dat deze bijwerking bij hem niet optreedt.
- Informeer de patiënt over mogelijke pijn bij inlopen.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax