

Longoncologie behandeling NSCLC paclitaxel-trastuzumab 1^e kuur

HER2+ stadium IV NSCLC tot progressie of niet verdragen bijwerkingen

Cyclus van 4 weken, kuur op dag 1, 8 en 15

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum PACLWKTRA1: kuur 1dag 1: 6uur PACLITAX1: kuur 1 dag 8: 3 uur PACLWKTRA2: kuur 1 dag 15: 4,5 u
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966E	chemo gemetastaseerd
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	inlooptijd	geneesmiddel	dosering	dosis	Pomp-stand	TIV	toelichting	Par.1	Par.2
	1							RR, P, T		
			Clemastine		2 mg			bolus		
			Dexamethason		20 mg			bolus		
			Ranitidine		50 mg			bolus		
								30 min. wachten		
		01:30	PACLITAXEL* in 250 ml NaCl 0,9%	90 mg/m ²	...mg			0,2 µm filter in folie		
		02:00	TRASTUZUMAB <u>Oplaaddosis eenmalig</u>	6 mg/kg	...mg	60	15	Totale inlooptijd is 2 uur		
		01:00	observatie							

datum	dag	inlooptijd	geneesmiddel	dosering	dosis	Pomp-stand	toelichting	Par.1	Par.2	
	8							RR, P, T		
			Clemastine		2 mg			bolus		
			Dexamethason		10 mg			bolus		
			Ranitidine		50 mg			bolus		
								30 min. wachten		
		01:30	PACLITAXEL* in 250 ml NaCl 0,9%	90 mg/m ²	...mg			0,2 µm filter in folie		

datum	dag	inlooptijd	geneesmiddel	dosering	dosis	Pomp-stand	toelichting	Par.1	Par.2
	15						RR, P, T		
			Clemastine		2 mg		bolus		
			Dexamethason		10 mg		bolus		
			Ranitidine		50 mg		bolus		
							30 min. wachten		
		01:30	PACLITAXEL * in 250 ml NaCl 0,9%	90 mg/m ²	...mg		0,2 µm filter in folie		
		01:00	TRASTUZUMAB	4 mg/kg					
							Observatie 30 min: alleen bij 2 ^e Trastuzumab infuus		

anti-emetica thuisadvies: zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp.

Verpleegkundige toedien-instructies:

- Observeer op overgevoeligheds- en infusiereacties.
- *Indien tijdens de eerste drie paclitaxel infusies geen overgevoelighedsreacties zijn opgetreden, mogen de daarop volgende paclitaxel infusies in 1 uur toegediend worden. Indien er overgevoelighedsreacties zijn, moet dit duidelijk op de aanvraag worden aangegeven samen met de gewenste toedientijd.

Achtergrondinformatie Paclitaxel en Trastuzumab

Informatie over de geneesmiddelen:

- Paclitaxel: Cytostaticum behorende tot de taxanen.
 - Allergische reacties worden waarschijnlijk veroorzaakt door Cremophor EL[®] (oplosmiddel) in de formulering.
- Trastuzumab: monoclonaal antilichaam tegen het humane epidermale groeifactor receptor eiwit (HER2-eiwit).
- Trastuzumab is onverenigbaar met glucose.

Voor meer informatie zie DocPortal

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – paclitaxel/trastuzumab

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax