

Longoncologie behandeling NSCLC cisplatine-docetaxel als radiosensitizer

1e lijns behandeling bij stadium III NSCLC, 5 weken radiotherapie met cisplatine-docetaxel als radiosensitizer

(voorafgegaan door 1klinische inductiekuur met Cisplatin/Gemcitabine of Cisplatin/Pemetrexed)

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: CisDocME: 2uur 45min CisDocNG: 2uur 45min
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
	Arts kruist aan: <input type="checkbox"/>	gemetast	339966B
	<input type="checkbox"/>	niet gem	339966A
	Naam + paraaf arts		
Gefaxt/gescand	Paraaf:		

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	1		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	DOCETAXEL in 500 ml NaCl 0,9%	20 mg/m ²	mg				
		00:30	500 ml NaCl 0,9%						
		01:00	CISPLATINE in 250 ml NaCl 0,9%	20 mg/m ²	mg		a.		

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	8		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	DOCETAXEL in 500 ml NaCl 0,9%	20 mg/m ²	mg				
		00:30	500 ml NaCl 0,9%						
		01:00	CISPLATINE in 250 ml NaCl 0,9%	20 mg/m ²	mg		a.		

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	15		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	DOCETAXEL in 500 ml NaCl 0,9%	20 mg/m ²	mg				
		00:30	500 ml NaCl 0,9%						
		01:00	CISPLATINE in 250 ml NaCl 0,9%	20 mg/m ²	mg		a.		

Verpleegkundige toedien-instructies en vervolg kuur: zie pagina 2

patiëntensticker

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	22		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	DOCETAXEL in 500 ml NaCl 0,9%	20 mg/m ²	mg				
		00:30	500 ml NaCl 0,9%						
		01:00	CISPLATINE in 250 ml NaCl 0,9%	20 mg/m ²	mg		a.		

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
	29		Dexamethason		8 mg		bolus		
		00:30	DOCETAXEL in 500 ml NaCl 0,9%	20 mg/m ²	mg				
		00:30	500 ml NaCl 0,9%						
		01:00	CISPLATINE in 250 ml NaCl 0,9%	20 mg/m ²	mg		a.		

Verpleegkundige toedien-instructies

- Prik het infuus met een roze naald in een grote vene, houd de patiënt warm en bedek de infuusarm met een (fleece)deken. Zie ook document 'pijnlijke infusie cytostatica' op de website van het Dagcentrum > patiëntenzorg > interventies.
- a: vóórdat de cisplatine aangehangen wordt, moet in totaal al 1000 ml vocht i.v. gegeven zijn!

(anti-emetica) thuisadvies:

- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

Instrueer patiënt om de komende 24 uur 8 glazen water te drinken (=extra).

Achtergrondinformatie NSCLC Cisplatine-docetaxel als radiosensitizer

Informatie over de behandeling:

- Indicatie: niet kleincellig longcarcinoom, 1e lijns behandeling bij stadium III, 5 weken radiotherapie met cisplatine-docetaxel als radiosensitizer.
- meestal voorafgegaan door 1 klinische inductiekuur met Cisplatin/Gemcitabine of Cisplatin/Pemetrexed. Dag 8 van de inductiekuur wel op dagcentrum.
- Evaluatie: aan het einde van de behandeling.

Informatie over het geneesmiddel:

- Docetaxel: behoort tot de taxanen
- Cisplatin: Cytostaticum behorende tot de platina verbindingen.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – cisplatin/gemcitabine
- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – cisplatin/pemetrexed
- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – cisplatine-docetaxel als radiosensitizer:

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Informeer de patiënt dat er minimaal 1,5 uur tussen het infuus en de radiotherapie moet zitten.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax