

In studieverband :.....   
 Buiten studieverband

**HOVON 124,  
 Fase 2,  
 Maintenance: Rituximab**

Therapielijst\aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntgegevens:	Datum aanvraag	Afdeling	12NAT: 02069	Gefaxt naar apothek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )	
	Code kuur E2:	339966F	immunotherapie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor		
Specialisme: IHMP Indicatie: recidief/ progressieve Waldenström Cyclusduur: 3 maanden Totaal: 2 jaar	Afspraakcodes DC: HO124SC: 1 uur	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Kuurnummer: .....                      opmerkingen:

**LET OP: eerste gift Rituximab altijd intraveneus toedienen.  
 Indien zich eerder overgevoelighedsreacties hebben voorgedaan, *niet* overgaan op subcutane toediening.**

\*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOP TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TIV	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1							RR, pols, temp		
	1		PREDNISOLON	p.o.	25 mg					
	1		CLEMASTINE	p.o.	2 mg					
	1		PARACETAMOL	p.o.	1000 mg					
								30 min wachten		
	1	5 à 6 min.	<b>RITUXIMAB</b> 1400mg in standaard spuitinhoud 11,7ml	s.c.	1400 mg			a.		
								15 min Observatie		

## Verpleegkundige toedieninstructies

- Nieuwe injecties moeten op een afstand van tenminste 2,5cm van een vorige injectieplaats worden toegediend en nooit in een gebied waar de huid pijnlijk, rood of hard is of waar deze blauwe plekken vertoont. Wissel de injectie plaatsen af en noteer deze in het zorgdossier. De naald na het inspuiten van de rituximab pas na enkele seconden terugtrekken om teruglopen van de vloeistof te voorkomen.
- Spuit *niet* schudden of rollend opwarmen. Alleen rustig zwenken.
- *Alleen* in de buik toedienen
- Rituximab s.c. moet diep-subcutaan in de buik worden geïnjecteerd met behulp van een naald van 25 Gauche (een oranje naald voor subcutane toediening).
- *Geen bloed opzuigen na het inbrengen van de naald. Na het injecteren van 2 ml even wachten om de hyaluronidase de tijd te geven om het interstitiële weefsel te verweken waardoor het injecteren van de overige hoeveelheid vloeistof makkelijker gaat.*
- Indien de patiënt verzoekt de injectie tussentijds te staken mag even gestopt worden. Hervatten mag op moment dat de patiënt aangeeft weer verder te kunnen.
- De vloeistof toedienen in 5-6 minuten. Niet masseren na injecteren om groter maken van injectie-reactieplaats te voorkomen.
- Indien de injectie pijnlijk is mag voorafgaande en nadien aan de injectie Emla zalf worden aangebracht. (N.B. inwerktijd ongeveer een uur) Na het geven van de injectie mag **geen** niet-steroïdale gel (NSAID, bv voltarengel) op de injectieplaats worden aangebracht.
- *a..* Screen op ondervoeding: neem elke 4 weken de MUST af.

## Achtergrondinformatie: HOVON 124, fase 2, Rituximab

### Informatie over de studie

- HOVON 124: Een fase 2 onderzoek, waarbij de combinatie ixazomib citraat, rituximab en dexamethason wordt onderzocht bij patiënten met de ziekte van Waldenström die een recidief of progressie hebben gekregen na eerdere behandeling. In de maintenance fase worden patiënten behandeld met rituximab.
- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl:

### Informatie over de geneesmiddelen:

- Rituximab: Rituximab is een genetisch geconstrueerd chimerisch muis/humaan monoklonaal antilichaam. Rituximab bindt zich specifiek aan het transmembraanantigeen CD20, een niet-geglycosyleerd fosfoproteïne, voorkomend op jonge en volwassen B-cellen.
- Aan de Rituximab voor subcutane toediening is hyaluronidase toegevoegd. Deze stof zorgt ervoor dat het bindweefsel tijdelijk soepeler wordt. Hierdoor kan de Rituximab zich beter subcutaan verspreiden.

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- SIB op maat
- Studie-informatie uitgereikt door arts

### Contact

- Onderzoeksarts: dr. Choi
- Datamanager: M. v.d. Weg (13385)

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

### Overig

- **Indien complicaties optreden tijdens de SC toediening:**
  - Stop Rituximab toediening
  - Breng infuus in en sluit NaCl 0,9% aan
  - Laat een collega de specialist en arts assistent waarschuwen.
  - Doe controles: RR, Pols en Temperatuur.
  - Bed in Trendelenburg.