

**Longoncologie behandeling SCLC studies, Caspian, carboplatine-etoposide, arm 3, 12NAT2193**

1<sup>e</sup> lijns bij SCLC, 1x per 3 weken, 4 kuren, gevolgd door Durvalumab (en eenmalig in week 16 Tremelimumab) maintenance

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: CASPIAN6: dag 1: 2,45 uur CASPIAN3: dag 2+3: 1,45 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring	..... ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pomp stand	toelichting	Par.1	Par.2
	1		Dexamethason		10 mg		bolus		
			Granisetron		1 mg		bolus		
		01:00	<b>CARBOPLATINE</b> in 250 ml Gluc 5% <i>Wordt beschouwd als reguliere zorg</i>	AUC 6		... mg	In folie a. RR, pols		
		01:00	<b>ETOPOSIDE</b> in 1000 ml NaCl 0,9% <i>Wordt beschouwd als reguliere zorg</i>	100 mg/m <sup>2</sup>		... mg	a. RR, pols b.		

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pomp stand	toelichting	Par.1	Par.2
	2		Dexamethason		10 mg		bolus		
		01:00	<b>ETOPOSIDE</b> in 1000 ml NaCl 0,9% <i>Wordt beschouwd als reguliere zorg</i>	100 mg/m <sup>2</sup>		... mg	a. RR, pols b.		

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pomp stand	toelichting	Par.1	Par.2
	3		Dexamethason		10 mg		bolus		
		01:00	<b>ETOPOSIDE</b> in 1000 ml NaCl 0,9% <i>Wordt beschouwd als reguliere zorg</i>	100 mg/m <sup>2</sup>		... mg	a. RR, pols b.		

**Verpleegkundige toedien-instructies**

- a. Controles zie **controlelijst**. Noteer start- en stoptijden.
- b. Pas de infusiesnelheid zo nodig aan afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene.

**anti-emetica thuisadvies:**

- dag 4 en 5 om 08.00 uur dexamethason 8 mg p.o.
- zo nodig medicatie metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp.

## **Achtergrondinformatie SCLC studies, Caspian, carboplatine-etoposide:**

### **Informatie over de studie**

Een fase 3 gerandomiseerde studie, bestaande uit drie armen:

Arm 1: carboplatine-etoposide-durvalumab-tremelimumab daarna maintenance durvalumab-tremelimumab

Arm 2: carboplatine-etoposide-durvalumab daarna maintenance durvalumab

Arm 3 : carboplatine-etoposide

### **Indicatie**

- Indicatie: 1e lijns behandeling bij kleincellig longcarcinoom, limited disease (LD) en extensive disease (ED)
- Patiënten krijgen profylactisch schedelbestraling na de chemotherapie.
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren.

### **Informatie over het geneesmiddel:**

- Carboplatine: Cytostaticum behorende tot de platinaverbindingen. Wordt vaak geleverd in glucose 5% in verband met langere houdbaarheid.
- Etoposide: Cytostaticum, Topoisomerase-2-remmer. Etoposide is slecht oplosbaar in water, hierdoor kunnen neerslagen ontstaan in de infusen. Het ontstaan van neerslagen is zeer onvoorspelbaar. Infuus niet toedienen wanneer er neerslagen zijn ontstaan. Voor meer informatie zie DocPortal.

### **Informatie voor patiënten over bijwerkingen:**

- Studie-informatie uitgereikt door arts

### **Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)**

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
  - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
  - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
  - Microlax

### **Contact:**

- Arts: Prof. H.J.M. Groen
- Research verpleegkundige: Thea Scholtens (47012)

## Controlelijst: Caspian, carboplatine-etoposide

Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens

### Start en stop tijden:

	Start	Stop
carboplatine		
etoposide dag 1		
etoposide dag 2		
etoposide dag 3		

### Controles:

	voor infusie			halverwege infusie (na 30 minuten)			na infusie		
	tijd	RR	Pols	tijd	RR	Pols	tijd	RR	Pols
<b>Dag 1</b> carboplatine									
etoposide									
<b>Dag 2</b> etoposide									
<b>Dag 3</b> etoposide									

### Bijzonderheden: