

Longoncologie behandeling SCLC studies, Caspian, durvalumab-tremelimumab maintenance, arm 1, 12NAT2193

1^e lijns bij SCLC, 1x per 3 weken, 4 kuren, gevolgd door Durvalumab (en eenmalig in week 16 Tremelimumab) maintenance

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: CASPIAN7: vanaf week 12 elke 4 weken: 2 uur CASPIAN8: alleen week 16: 3 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

Registratieformulier: vul studiecode in: L075 dus geen ILOP!!

VANAF WEEK 12, ELKE 4 WEKEN

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pomp stand	toelichting	Par.1	Par.2
		01:00	DURVALUMAB In 250 ml NaCl 0,9% <i>let op: studieaanvraag nodig</i>		1500 mg		0,2 µm filter <i>a. RR, pols</i>		
		00:30					<i>observatie</i>		

NB: ALLEEN IN WEEK 16 durvalumab met tremelimumab

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pomp stand	toelichting	Par.1	Par.2
		01:00	TREMELIMUMAB in 250 ml NaCl 0,9 % <i>let op: studieaanvraag nodig</i>		75 mg		0,2 µm filter <i>a. RR, pols</i>		
		01:00	DURVALUMAB In 250 ml NaCl 0,9% <i>let op: studieaanvraag nodig</i>		1500 mg		0,2 µm filter <i>a. RR, pols</i>		
		00:30					<i>observatie</i>		

Verpleegkundige toedien-instructies

- *a.* Controles zie **controlelijst**. Noteer start- en stoptijden.
- Registratieformulier: **vul studiecode in: L075** dus geen ILOP!!

Achtergrondinformatie SCLC studies, Caspian, durvalumab-tremelimumab maintenance:

Informatie over de studie

Een fase 3 gerandomiseerde studie, bestaande uit drie armen:

Arm 1: carboplatine-etoposide-durvalumab-tremelimumab daarna maintenance durvalumab-tremelimumab

Arm 2: carboplatine-etoposide-durvalumab daarna maintenance durvalumab

Arm 3 : carboplatine-etoposide

Indicatie

- Indicatie: 1e lijns behandeling bij kleincellig longcarcinoom, limited disease (LD) en extensive disease (ED)
- Patiënten krijgen profylactisch schedelbestraling na de chemotherapie.
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren.

Informatie over het geneesmiddel:

- Durvalumab: een humaan monoklonaal antilichaam tegen PD-L1. Het blokkeert de PD-1 pathway. Hiermee wordt voorkomen dat de PD1 de T-cel productie stopt. De T-cellen nemen toe in aantal en richten zich op de tumorcellen.
Bijwerkingen die zouden kunnen voorkomen: infusie gerelateerde bijwerkingen, enterocolitis, dermatitis, hepatotoxiciteit of hepatitis, endocrinopathie, neuropathie of neurologische bijwerkingen, pancreatitis, pneumonitis en andere infecties, vermoeidheid, misselijkheid, diarree, verminderde eetlust, huiduitslag, jeuk.
- Tremelimumab: een CTLA-4 antilichaam. blokkeert het inhiberende signaal als gevolg van CTLA-4 binding aan B7 liganden op antigeen presenterende cellen, waardoor handhaving T-cel homeostase.
Bijwerkingen die zouden kunnen voorkomen: infusie gerelateerde bijwerkingen, enterocolitis, darmperforatie, buikpijn, uitdroging, misselijkheid en braken, verminderde eetlust, dermatitis met urticaria, huidexfoliatie, droge huid, endocrinopathie, hepatitis, pancreatitis, longproblemen, neurologische bijwerkingen, pancytopenie

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Studie-informatie uitgereikt door arts

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax

Contact:

- Arts: Prof. H.J.M. Groen
- Research verpleegkundige: Thea Scholtens (47012)

Controlelijst: Caspian, durvalumab-tremelimumab maintenance

Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens

Start en stop tijden:

	Start	Stop
tremelimumab		
durvalumab		

Controles:

Dag 1	voor infusie			halverwege infusie (na 30 minuten)			na infusie		
	tijd	RR	Pols	tijd	RR	Pols	tijd	RR	Pols
tremelimumab									
durvalumab									

Bijzonderheden: