

Longoncologie behandeling SCLC studies TAHOE M16-289 12NAT02174

Rovalpituzumab tesirine

2 kuren à 6 weken versus Topotecan à 3 weken tot progressie

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: TAHOE: 120 min
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		923750	immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

Registratieformulier: vul studiecode in: L076 dus geen ILOP!

NB : dag -1, dag 1 en dag 2 dexamethason 2 x dd 8 mg per os.

Op de dag van de Rovalpituzumab moet de dexamethason tussen 30 minuten en vier uur voor de Rovalpituzumab ingenomen worden. (Noteer inname tijd dexamethason op controlelijst)

Als er geen Dexamethason geslikt is, mag de Rovalpituzumab niet gegeven worden!

datum	inlooptijd	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						a. RR, pols, temp		
	00:30	ROVALPITUZUMAB tesirine in 50 ml NaCl 0,9% NB:studieaanvraag nodig		0.3 mg/kg		b,c. 0,2 µm filter a. RR, pols, temp		
						30 min. observatie a. RR, pols, temp d.		

Verpleegkundige toedien-instructies

- a. Noteer controles op **controlelijst**.
- b. Noteer start - en stoptijden op de **controlelijst**.
- c. Observeer op infusiereacties.
- d. **30 min** na inloop, bloedafname uit andere arm dan infuusarm, en noteren op controlelijst
Adviseer patiënten: Vermijd onbeschermd zonnen, tot 30 dagen na toediening rovalpituzumab.

Achtergrondinformatie TAHOE studie Rovalpituzumab versus Topotecan.

Informatie over de kuur:

Een gerandomiseerde, open label, multicenter, fase 3 studie, waarbij Rovalpituzumab (Rova-T) wordt vergeleken met de standaard behandeling met Topotecan.

- Rovalpituzumab 1x per 6 weken (totaal 2 giften)
- Indicatie: tweedelijns behandeling bij SCLC.
- **Registratieformulier: vul studiecode in: LO76.**

Informatie over het geneesmiddel:

- Rovalpituzumab tesirine (Rova-T) is een gehumaniseerd DDL3-specifiek IgG1 monoclonaal antilichaam dat het immuunsysteem aanzet om de kankercellen te bestrijden.
- Relevante bijwerkingen: moeheid, pleuravocht, perifeer oedeem, thrombopenie en huidreacties

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Patiënt ontvangt patiënten folder over Rovalpituzumab (Rova-T) via de poli.
gebruik van sterke CYP3A4 remmers dient vermeden te worden (pyrrollobenzodiazepine is een substraat van CYP3A4).

Contact:

- Onderzoeksarts: prof.dr H.J.M. Groen (55759)
- Researchverpleegkundige: Thea Scholtens (47012)

Controlelijst: TAHOE studie Rovalpituzumab versus Topotecan.

Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens

Inname tijd dexamethason:.....

Starttijd Rovalpituzumab:.....uur

Stoptijd Rovalpituzumab:.....uur

Controles:

Tijd	Tijdstip invullen	RR	Pols	Temp	bloedafname	paraaf
Vooraf aan Rovalpituzumab						
Na inloop Rovalpituzumab						
30 min na inloop Rovalpituzumab						

Bijzonderheden: