

Longoncologie behandeling NSCLC Pembrolizumab

2^e lijns behandeling bij NSCLC met PDL1>1%, na eerdere chemo, of na TKI bij EGFR- of ALK-positieve tumormutaties.
Eens per drie weken tot progressie

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: PEMBROLIZU: 1UUR
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	inlooptijd	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
	00:30	PEMBROLIZUMAB in 100 ml NaCl 0,9%	2 mg/kgmg		0,2 µm filter <i>a.</i>		
						RR, pols, temp		

Verpleegkundige toedien-instructies

- a. observeer op infusiereacties*

Achtergrondinformatie Pembrolizumab

Informatie over de kuur:

- Geneesmiddel: op compassionate use.
- Indicatie: 2^e lijns behandeling voor NSCLC met PDL1>1%

Informatie over het geneesmiddel:

- Pembrolizumab is een gehumaniseerd anti PD-1 monoclaal antilichaam. Pembrolizumab blokkeert de interactie tussen PD-1 en de liganden PD-L1 en PD-L2. Deze liganden komen vaak tot overexpressie op tumorcellen. Wanneer deze normaal gesproken aan elkaar binden, voorkomt dit activatie van T-cellen. Als pembrolizumab dit blokkeert neemt de activiteit van de lymfocyten toe waardoor ze de tumor kunnen afbreken en zorgen voor afstoting door het immuunsysteem.
- Relevante bijwerkingen:
 - Infusiereacties
 - Algemene bijwerkingen:
 - vermoeidheid
 - griep-syndroom
 - misselijkheid, verminderde eetlust
 - jeuk, huiduitslag
 - diarree
 - gewrichtspijn
 - koorts
 - hypothyreoïdie
 - pneumonitis

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Patiënt ontvangt patiënten folder over pembrolizumab via de poli.