

Longoncologie behandeling SCLC studies, Caspian, durvalumab maintenance, arm 2, 12NAT2193

1^e lijns bij SCLC, 1x per 3 weken, 4 kuren, gevolgd door Durvalumab maintenance

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: CASPIAN7: vanaf week 12 elke 4 weken: 2 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

Registratieformulier: vul studiecode in: LO75 dus geen ILOP!!

VANAF WEEK 12, ELKE 4 WEKEN

datum	dag	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pomp stand	toelichting	Par.1	Par.2
		01:00	DURVALUMAB In 250 ml NaCl 0,9% <i>let op: studieaanvraag nodig</i>		1500 mg		0,2 µm filter <i>a. RR, pols</i>		
		00:30					<i>observatie</i>		

Verpleegkundige toedien-instructies

- *a.* Controles zie **controlelijst**. Noteer start- en stoptijden.
- Registratieformulier: **vul studiecode in: LO75 dus geen ILOP!!**

Achtergrondinformatie SCLC studies, Caspian, durvalumab maintenance:

Informatie over de studie

Een fase 3 gerandomiseerde studie, bestaande uit drie armen:

Arm 1: carboplatine-etoposide-durvalumab-tremelimumab daarna maintenance durvalumab-tremelimumab

Arm 2: carboplatine-etoposide-durvalumab daarna maintenance durvalumab

Arm 3 : carboplatine-etoposide

Indicatie

- Indicatie: 1e lijns behandeling bij kleincellig longcarcinoom, limited disease (LD) en extensive disease (ED)
- Patiënten krijgen profylactisch schedelbestraling na de chemotherapie.
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren.

Informatie over het geneesmiddel:

- Durvalumab: een humaan monoklonaal antilichaam tegen PD-L1. Het blokkeert de PD-1 pathway. Hiermee wordt voorkomen dat de PD1 de T-cel productie stopt. De T-cellen nemen toe in aantal en richten zich op de tumorcellen.

Bijwerkingen die zouden kunnen voorkomen: infusie gerelateerde bijwerkingen, enterocolitis, dermatitis, hepatotoxiciteit of hepatitis, endocrinopathie, neuropathie of neurologische bijwerkingen, pancreatitis, pneumonitis en andere infecties, vermoeidheid, misselijkheid, diarree, verminderde eetlust, huiduitslag, jeuk.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Studie-informatie uitgereikt door arts

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax

Contact:

- Arts: Prof. H.J.M. Groen
- Research verpleegkundige: Thea Scholtens (47012)

Controlelijst: Caspian, durvalumab maintenance

Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens

Start en stop tijden:

	Start	Stop
durvalumab		

Controles:

	voor infusie			halverwege infusie (na 30 minuten)			na infusie		
Dag 1	tijd	RR	Pols	tijd	RR	Pols	tijd	RR	Pols
durvalumab									

Bijzonderheden: