

**Pembrolizumab**  
**bij recidief of refractaire Hodgkin lymfoom**

Therapielijst\aftekenlijst\aanvraag cytostatica

Patiëntgegevens:	Datum aanvraag	Afdeling		Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )	
	Code kuur E2:	339966F	immunotherapie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor		
Specialisme: IHMP Indicatie: Recidief of refractair Hodgkin lymfoom Cyclusduur: 3 weken Totaal: tot progressie of onacceptabele toxiciteit.	Afspraakcodes DC: PEMBROLIZU: 1 uur	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

**Opmerkingen:**

**Kuurnummer: .....**

\*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TIV	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1							RR, pols, temp		
	1	00:30	<b>Pembrolizumab</b> In 100ml NaCl 0,9%	iv	200 mg			0,2 µm filter a.		
	1							RR, pols, temp		

**Verpleegkundige toedieninstructies:**

- a. Observeer op infusiereacties.

**Medische instructies:**

- Recidief of refractair Hodgkin lymfoom na 2 lijnen chemotherapie en Brentuximab vedotin of na autologe stamceltransplantatie.
- Recidief of refractair Hodgkin lymfoom niet geschikt voor salvage therapie na Brentuximab vedotin.

patiëntgegevens

## Achtergrondinformatie Pembrolizumab

### Informatie over de kuur:

- Zie link naar webpagina: <https://hematologiegroningen.nl/protocollen/> : Maligne lymfomen: Hodgkin en NHL
- Indicatie: Recidief of refractair Hodgkin lymfoom.

### Informatie over het geneesmiddel:

- Pembrolizumab is een gehumaniseerd anti PD-1 monoklonaal antilichaam. Pembrolizumab blokkeert de interactie tussen PD-1 en de liganden PD-L1 en PD-L2. Deze liganden komen vaak tot overexpressie op tumorcellen. Wanneer deze normaal gesproken aan elkaar binden, voorkomt dit activatie van T-cellen. Als pembrolizumab dit blokkeert neemt de activiteit van de lymfocyten toe waardoor ze de tumor kunnen afbreken en zorgen voor afstoting door het immuunsysteem.

Relevante bijwerkingen:

- vermoeidheid
- griep-syndroom
- jeuk
- huiduitslag
- diarree
- gewrichtspijn
- misselijkheid
- koorts
- hypothyreoïdie
- pneumonitis

Wees ook altijd alert op infusiereacties!

Voor meer informatie zie: DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- SIB op maat