

In studieverband
 Buiten studieverband

ALL >40 jaar: HOVON 100 ("schema C")

INDUCTIE II

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling	12-NAT: 1395	Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m2)	
	Code kuur E2↓			
	<input type="checkbox"/>	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor	Naam + paraaf VPK1	Naam + paraaf VPK2
Specialisme: IHM Indicatie: ALL > 40 jr Cyclusduur: 22-29 dagen Totaal: 4 kuren +/- maintenance Bron: www.hovon.nl /HOVON 100	Afspraakcodes DC: VINCR/DOXO 1 uur	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

** (klinisch) MVK = op medicatie verantwoordingskaart aftekenen

Datum	In EVS plaatsen	Dag	INLOOPTIJD (hr:min)/ of Tijden	GENEESMIDDEL	TW *	Dosis	Pomp- stand	toelichting	Paraaf 1	Paraaf 2= aanhangen
	ja	Dag 1 t/m dag21	07:00 uur 17:00 uur	Prednisolon 2x20mg/m ² /dd na dag 22 in 7 dagen afbouwen tot 0 mg.	p.o. p.o.mg mg		recept arts	** **	** **
		Dag 1		Ondansetron	i.v.	8 mg		bolus		
			00:15 of 09:45-10:00	VINCRISTINE Totaal 1mg In 50 ml. Nacl0,9%	i.v.mg		in max. 15 min. a.b.		
			00:15 of 10:30-10:45	DOXORUBICINE Totaal 40 mg/m ² In 50 ml. Nacl0,9% Inlooptijd:30 min	i.v.mg		in max. 15 min. a.		
								c. venapunctie		
		Dag 8		Ondansetron	i.v.	8 mg		bolus		
			00:15 of 09:45-10:00	VINCRISTINE Totaal 1 mg	i.v.mg		in max. 15 min. a.b.		
			00:15 of 10:30-10:45	DOXORUBICINE Totaal 40 mg/m ²	i.v.mg		in max. 15 min. a.		
								c. venapunctie		
		Dag 15		Ondansetron	i.v.	8 mg		bolus		
			00:15 of 09:45-10:00	VINCRISTINE Totaal 1 mg	i.v.mg		in max. 15 min. a.b.		
			00:15 of 10:30-10:45	DOXORUBICINE Totaal 40 mg/m ²	i.v.mg		in max. 15 min. a.		

patiëntensticker

METHOTREXAAT

i.t.

15 mg

PREDNISOLON

25 mg

Verpleegkundige toedien-instructies

- a. Kies voor een infusiesnelheid afhankelijk van de plaats, dikte en conditie van de vene
- b. Bij vaatirritatie: spoel de vene extra na met NaCl 0,9%.
- c. Extra labafname via research verpleegkundige op dag 1 en dag 8

Hydratie en overige medicatieschema invoeren in EVS indien klinisch gegeven

Datum	Paraaf arts zodra in EVS geplaatst	Hydratieschema/ medicatie
		Ondansetron (zofran): voorafgaand aan doxorubicine 1x8mg i.v. Daarna 2x8mg p.o. zonodig
		Benzylpenicilline-natrium (Penicilline) 4x1 milj E/i.v.: start dag 2 tot eind mucositis
		Norethisteron (Primolut N.) 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)
		PCP profylaxe cotrimoxazol za en zo 2 x 960 mg/po en valaciclovir 2 x 500 mg
		Prednison na dag 22 in 7 dagen afbouwen tot 0 mg.

MEDISCHE INSTRUCTIES

- CVK
- Bij neuropathie dosis oncovin reduceren
- Medicatie behorend bij kuur invoeren in EVS op stofnaam
- **Start Inductie II (schema C) vanaf dag 22 na start Consolidatie bij arm A of vanaf dag 29 bij Arm B:**
ANC > $1.0 \times 10^9/l$ en trombocyten > $100 \times 10^9/l$;
Patiënt in CR;
Normale lever- en nierfuncties ;
WHO- performance 0-2;
Patiënt goede cardiale, pulmonale, neurologische en metabole functies heeft;
Geen oncontroleerbare infecties.
- **Extra labafname via research verpleegkundige op dag 1 en dag 8**
- Bloedsuiker controles ivm prednison
- Prednison in 7 dagen afbouwen tot 0 mg.

VERPLEEGKUNDIGE INSTRUCTIES (klinisch)


- Controleer of alle medicatie in EVS is geplaatst
- Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta mogen **6 dagen** na de laatste gift **doxorubicine** worden opgeheven; datum:
- Dagelijks wegen ten behoeve van vochtbalans.
- Mucositisscore bijhouden.
- Mondverzorging.
- SIB opmaat uitreiken <http://www.sibopmaat.nl/>
- Cave neuropathie

ACHTERGRONDINFORMATIE

Informatie over de studie:

- **HOVON 100ALL/EORTC 06083: een prospectieve gerandomiseerde trial naar het effect van Clofarabine toegevoegd**

aan pre-fase en consolidatie therapie bij volwassenen met acute lymfatische leukemie.



Vincristine (Synoniem: Oncovin, leurocristine)

- Cytostaticum behorende tot de vinca-alkaloiden
- [Link](#)
- Attentie bij extravasatie: blaarvormend; zie crashkaart
- Cave neuropathie klachten.

Doxorubicine (Synoniem: Adriamycine, Adriblastine, 14-hydroxydaunomycine)

- Cytostaticum, anthracycline
- [link](#)
- Urine kan oranje gekleurd zijn. Dragen van contactlenzen eerste 48 uur na toediening niet toegestaan.
- Attentie bij extravasatie: blaarvormend; zie crashkaart

Contact:

- Onderzoeksarts: dr. M. Bellido
- Research nurse: M Gelderloos