

# Longoncologie behandeling NSCLC NVALT 22 12NAT 2331 Pemetrexed maintenance

Bij NSCLC, na 4 kuren cisplatine-pemetrexed als maintenance behandeling

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: PEMETREXED 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring	..... ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966B	chemo gemetast
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

## Alimta bestellen bij Lilly via het orderformulier H3E-UT-0085 door de apotheek

NB voorbereiding:

- 1 week vóór dag 1 starten met Foliumzuur 1x dd 0.5 mg en vitamine B<sub>12</sub> 1000 µg 1x/6 weken

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
		Dexamethason		10 mg		bolus		
	00:10	<b>PEMETREXED (Alimta)</b> in 100 ml NaCl 0,9% <i>studieaanvraag nodig</i>	500 mg/m <sup>2</sup>	mg				

### Verpleegkundige toedien-instructies

- Check of de patiënt de avond vóór de kuur 8 mg dexamethason heeft ingenomen.

anti-emetica thuisadvies:

Dexamethason:

- dag 1 om 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 2 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 3 om 08.00 en 20.00 uur 8 mg p.o.
- dag 4 om 08.00 en 20.00 uur 4 mg p.o.
- dag 5 om 08.00 uur 4 mg p.o.

zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp

## Achtergrondinformatie NSCLC Pemetrexed monotherapie bij de NVALT 22 studie

### Informatie over de kuur:

- Indicatie: NSCLC
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

### Informatie over de geneesmiddel:

- Pemetrexed: Cytostaticum, Foliumzuuranalogen, een 'multi-targeted' antifolaat
  - Om de incidentie en ernst van huidreacties te verminderen krijgt de patiënt een recept voor Dexamethason.
  - Om de toxiciteit te verminderen krijgt de patiënt recepten voor vitaminesupplementen.

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting - pemetrexed

### Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- Geen NSAID's 2 dagen voor tot en met 2 dagen na de Pemetrexed. NSAID's staken bij kreat klaring < 35 ml/min.
- Zo nodig:
  - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
  - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
  - Microlax
- Foliumzuur 1x dd 0.5 mg en vitamine B<sub>12</sub> 1000 µg 1x/6 weken