

LONGONCOLOGIE BEHANDELING COMPASSIONATE USE NIVOLUMAB

Bij (aankruisen)

- SCLC, na chemotherapie
- Mesothelioom na chemotherapie
- Thymoom na chemotherapie

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: NIVOLUMAB: 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
	00.30	NIVOLUMAB in 100 ml NaCl 0,9%	240 mg	240 mg		filter 0,2 µm		

Verpleegkundige toedien-instructies

- Observeer op infusiereacties.

Achtergrondinformatie behandeling Compassionate use Nivolumab

Informatie over de kuur:

- Indicatie: op compassionate use basis na chemotherapie bij patiënten met een mesothelioom, thymoom of SCLC.
- Patiënten van de afdeling longoncologie die Nivolumab krijgen:
 - mogen niet thuis door Certe bloed-geprikt worden; een aantal waarden die de arts wil hebben kunnen niet door Certe geprikt worden,
 - moeten in het UMCG 1,5 uur vóór de poliafspraak bloed laten prikken op het priklab, .

Informatie over het geneesmiddel:

- Nivolumab: humaan monoklonaal antilichaam PD- L1. Blokkeert de PD-1 pathway. Hiermee wordt voorkomen dat de PD1 de T-cel-productie stopt. De T-cellen nemen toe in aantal en keren zich tegen de tumorcellen.
- Bijwerkingen:
 - Infusiereacties:
 - koorts, koude rilling
 - hoofdpijn
 - huiduitslag
 - jeuk
 - gewrichtspijn
 - bronchospasmen
 - hyper- of hypotensie
 - Misselijkheid
 - Diarree
 - Benauwdheid
 - Vermoeidheid
 - Huiduitslag
 - Verminderde eetlust
 - Pneumonitis
 - Buikpijn

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Patiënten-Informatie uit Doc-portal
- Informatiekaartje uitgereikt door arts