

## Longoncologie behandeling Compassionate use Nivolumab

Bij (aankruisen)

- SCLC, na chemotherapie
- Mesothelioom na chemotherapie
- Thymoom na chemotherapie

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: NIVOLUMAB: 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring	..... ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
	00.30	<b>NIVOLUMAB</b> in 100 ml NaCl 0,9%	240 mg	240 mg		filter 0,2 µm		

### Verpleegkundige toedien-instructies

- Observeer op infusiereacties.

## Achtergrondinformatie behandeling Compassionate use Nivolumab

### Informatie over de kuur:

- Indicatie: op compassionate use basis na chemotherapie bij patiënten met een mesothelioom, thymoom of SCLC.
- Patiënten van de afdeling longoncologie die Nivolumab krijgen:
  - mogen niet thuis door Certe bloed-geprikt worden; een aantal waarden die de arts wil hebben kunnen niet door Certe geprikt worden,
  - moeten in het UMCG 1,5 uur vóór de poliafspraak bloed laten prikken op het priklab, .

### Informatie over het geneesmiddel:

- Nivolumab: humaan monoklonaal antilichaam PD- L1. Blokkeert de PD-1 pathway. Hiermee wordt voorkomen dat de PD1 de T-cel-productie stopt. De T-cellen nemen toe in aantal en keren zich tegen de tumorcellen.
- Bijwerkingen:
  - Infusiereacties:
    - koorts, koude rilling
    - hoofdpijn
    - huiduitslag
    - jeuk
    - gewrichtspijn
    - bronchospasmen
    - hyper- of hypotensie
  - Misselijkheid
  - Diarree
  - Benauwdheid
  - Vermoeidheid
  - Huiduitslag
  - Verminderde eetlust
  - Pneumonitis
  - Buikpijn

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Patiënten-Informatie uit Doc-portal
- Informatiekaartje uitgereikt door arts