

Toedienlijst Intraveneuze provocatietest

Specialisme :IYYP
 Totaal :eenmalig
 Afspraakcode :IVPROVOCAT
 06:30 uur

Patientgegevens

Behandelaar:
 Datum:

Tijd (hr:min)	Geneesmiddel	Toediening	Pompstand (ml/uur)	Toelichting
				Leg klaar: 0,3 ml (1 ml=1 mg) Adrenaline voor i.m, Adrenaline voor iv en 2 mg Clemastine voor i.v.
				Zet de spoedkar klaar
				Urine laten inleveren. Zie achtergrondinformatie
				Monitor aansluiten
				RR, pols, ademhaling
	NaCl 0,9%	i.v.	30	Waakinfuus aanleggen
				Bloedafname: tryptase
..... (1/100e deel)	i.v.		Patiënt instrueren om klachten direct te melden.
00:30				30 min. observatie
..... (5/100e deel)	i.v.		Patiënt instrueren om klachten direct te melden.
00:30				30 min observatie
..... (1/4e deel)	i.v.		Patiënt instrueren om klachten direct te melden.
00:30				30 min observatie
..... (volledige dosis)	i.v.		Patiënt instrueren om klachten direct te melden.
02:00				2 uur observatie
				Geen reactie: ontslag Wel reactie: urine inleveren en evt bloedafname. Ontslag of ander beleid in overleg met arts.

Verpleegkundige instructies:

- Indien astma, sluit vernevelset aan en vul met Ipramol, aangevuld met NaCl 0,9% tot 4 ml.
- Observeer op: Allergische en anafylactische verschijnselen zoals roodheid, galbulten, misselijkheid, benauwdheid onwel worden, tensiedaling, etc.
- Controles: ieder kwartier RR, pols en temp. In het laatste uur elk half uur.
- Noteer de gegevens in EPIC
- Bij een reactie: laat nogmaals urine inleveren. Bloedafname op tryptase in overleg met arts. Tijdstip bloedafname: 1 uur na het begin van de reactie.

Achtergrondinformatie intraveneuze provocatietest

Indicatie:

Intraveneus provocatieonderzoek allergeen (diverse geneesmiddelen). Regulier diagnostiek in het kader van geneesmiddelenallergie.

Contra-indicatie:

- β -blokker gebruik
- instabiel astma

Voorwaarden:

Indien we zelf de medicatie niet kunnen bereiden of wanneer dat niet wenselijk is (bedrijfsvoerende beoordeelt dit):

MZA plant de patiënt ruim van te voren (minimaal 3 weken) in, in overleg met de bedrijfsvoerende.

Arts vraagt medicatie aan via EPIC, via therapieplan.

Bedrijfsvoerende mailt direct (dus minimaal 3 weken van te voren) naar de allergietesten@apoth.umcg.nl de benodigde medicatie en doses. Bij grote spoed: dagapotheke bereidingen via 55755.

Informatie over het geneesmiddel:

Zie DocPortal

Bij allergische/ anafylactische reactie: zie Dagcentrum protocol anafylactische reacties.

Bereiden adrenaline voor I.V.:


Uit 1 ampul adrenaline á 10 ml (1 ml = 0,1 mg)

1 ml opzuigen (0,1 mg) dit verdunnen met NaCl 0,9%

tot een eindvolume van 10 ml (zodat 10 ml = 0,1 mg)

Elektroden aansluiten als volgt:

- - is rood
- G is geel
- + is groen



Urine inleveren:

Voeg Chloorhexidine aan de urine toe, zie bepalingenwijzer (microscopje) op intranet.

Indien geen allergische en/of anafylactische reactie plaatsvindt tijdens de test mag de urine na de test weggegooid worden. Indien wel een reactie plaatsvindt, vraag dan de patiënt om na de reactie nogmaals urine in te leveren. Beide urine-monsters dienen dan opgestuurd te worden naar het lab ter bepaling van methylhistamine. Het moet wel duidelijk zijn voor het lab en arts welk monster vóór en welke ná de reactie werd afgenomen. Daarom is het belangrijk om via de rubriek "**Opmerkingen**" aan te geven welke portie urine vóór en welke portie na een eventuele reactie is afgenomen.