

Longoncologie behandeling NSCLC Compassionate use Cetuximab en Afatinib

Indicatie: EGFR amplificatie als resistentie mechanisme bij progressie op EGFR TKI

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: CETUX-2wk: 4 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	immunotheraoie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

Compassionate use nummer:.....

Afatinib: 1 x dd p.o. : eigen beheer.

datum	dag	inlooptijd	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par. 1	Par. 2
							a. RR, pols, temp		
			Dexamethason		8 mg		bolus		
			Clemastine		2 mg		bolus		
		02:00	CETUXIMAB 5mg/ml	500 mg/m ²	...mg		a. b.		
		01:00	Observatie				a.		

Verpleegkundige toedien-instructies:

- a. Controles pré-, mid-, post Cetuximab en na 1 uur observatie.
- b. Observeer op overgevoelighedsreacties.

patiëntensticker

Achtergrondinformatie NSCLC Cetuximab en Afatinib Compassionate use

Informatie over de kuur:

- EGFR amplificatie als resistentie mechanisme bij progressie op EGFR TKI

Informatie over het geneesmiddel:

- Cetuximab: Monoklonaal antilichaam tegen EGFR (epidermal growth factor receptor)
- Afatinib (Giotrif): antineoplastische proteïnekinaseremmer, blokkeert EGFR
 - Bijwerkingen: diarree, huidaandoeningen, stomatitis en paronychia.

Voor meer informatie over Cetuximab zie: Doc Portal

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

Longoncologie – voorlichting - cetuximab : Doc Portal

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Instrueer de patiënt onmiddellijk contact op te nemen met zijn behandelend arts in het geval van late infusie-reacties.

Co-medicatie - recepten via arts

- Zo nodig:
 - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
 - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
 - Microlax