

## Toedienlijst Patisiran (Onpattro)

Specialisme	: IALP	339957B
Cyclusduur	: 3 weken	
Totaal	: tot progressie of onacceptabele toxiciteit	
Afspraakcode	: Patisiran-1: 3 uur, Patisiran-2: 2 uur	

Inloop-tijd (hr:min)	Geneesmiddel	Dosering	Toediening	Pompstand (ml/uur)	TIV (ml)	Toelichting
						<i>a. let op belangrijk!</i>
						<i>b. RR, P, T, Gewicht</i>
						<i>c. Lab afname</i>
	<i>*Dexamethason</i>		p.o			<i>a. Arts regelt recept</i>
	<i>*Ranitidine</i>		p.o			
	<i>*Cetirizine</i>		p.o			
	<i>*Paracetamol</i>		p.o			
00:15	<b>Patisiran</b> In 200ml NaCl 0,9%	0.3 mg/kg (max. 30 mg)	iv	60	15	<i>d. 1,2 µm (PES-filter)</i>
01:05				180		Rest (totale inloop tijd 80 min.)
01:00						<i>e. Observatie</i>

### Verpleegkundige toedien-instructies:

- a. patiënt dient de pre-medicatie (Dexamethason 10 mg, Ranitidine 150 mg, Cetirizine 10 mg, Paracetamol 500 mg ) **vooraf** te hebben ingenomen. Dit wordt door de behandelend arts goed door gesproken met de patiënt. Mocht de patiënt de medicatie niet minimaal een uur van te voren hebben ingenomen dan kan de behandeling **niet** plaats vinden.
- b. controles vooraf en bij klachten.
- c. hoeft niet gewacht te worden op de uitslag voor start medicatie.
- d. Plaats een **1,2 µm** (PES-filter) aan de infuuslijn, net vóór het kraantje en ontluicht deze.
- e. Observatie alleen gift 1 en vervolgens op indicatie van de arts.

## Achtergrondinformatie Toedienlijst Patisiran (Onpattro)

### Informatie over de behandeling:

- **Indicatie:** Erfelijke ATTR-amyloïdose, als gevolg van een (autosomaal dominant) erfelijke puntmutatie van het voorlopereiwit transthyretine (TTR). Klinisch wordt dit type vooral gekenmerkt door (familiaire) zenuw schade aan de uitwendige en inwendige zenuwen, maar ook wel door betrokkenheid van hart, nieren, darm en ogen.

Voor meer informatie over amyloïdose zie: amyloïdose

### Informatie over de geneesmiddelen:

- Patisiran (ALN-TTR02)(Onpattro) : een zogeheten small interfering RNA (siRNA), een nieuw geneesmiddel voor ATTR amyloïdose om daarmee de ernstige verschijnselen zoals polyneuropathie (en mogelijk cardiomyopathie) te stoppen.
  - Bijwerkingen:
    - Infusiereacties: koorts, gewrichtspijn, benauwdheid, hoesten, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, hypertensie, hypotensie, spierpijn, misselijkheid, jeuk, huiduitslag, rillingen, transpireren, tachycardie, urticaria, braken
    - Zeer zeldzaam: ernstig overgeven/misselijkheid. Soms huiderytheem.

Voor meer informatie zie: Doc Portal

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- informatie uitgereikt door arts

### Co-medicatie:

- 2,500 IU vitamine A

### Contact:

- Dr HLA Nienhuis tel: 69648

### Overige verpleegkundige informatie:

- Bestelling gaat via therapieplan, receptuur steriel doet de bereiding (tel 14091). Zakje wordt zonder filter geleverd (zie verpleegkundige toedien instructies c).