

## Longoncologie behandeling NSCLC NVALT 22 12NAT2331

### Bevacizumab maintenance

bij stadium IV NSCLC. Na 4 kuren carboplatine-paclitaxel-bevacizumab. Maintenance behandeling à 3 weken tot progressie

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: NVALT22-BEVA-1 (kuur 1): 2 uur NVALT22-BEVA-2 (kuur 2): 1,5 uur NVALT22-BEVA-3 (kuur ≥ 3) 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring	..... ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	Inlooptijd (hr:min)	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
	01:30	<b>BEVACIZUMAB</b> in 100 ml NaCl 0,9% <i>studieaanvraag nodig</i>	15 mg/kg			<i>a.</i>		
				mg				

#### Verpleegkundige toedien-instructies

- *a.* Indien goed getolereerd:
  - 1<sup>e</sup> infuus: inlooptijd 01:30
  - 2<sup>e</sup> infuus: inlooptijd 01:00
  - ≥ 3<sup>e</sup> infuus: inlooptijd 00:30
- Bevacizumab is onverenigbaar met glucoseoplossingen.

## Achtergrondinformatie NSCLC Bevacizumab maintenance NVALT 22

### Informatie over de kuur:

- Een fase III open label studie waarbij de behandeling met carboplatine, paclitaxel, bevacizumab wordt vergeleken met cisplatin, pemetrexed bij nieuw gediagnostiseerd gemetastaseerd KRAS gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom.
- Indicatie: NSCLC
- Maintenance behandeling à 3 weken
- Evaluatie: na 2 en na 4 kuren

### Informatie over de geneesmiddelen:

- Bevacizumab: Recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam. Bevacizumab bindt aan de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF), de belangrijkste factor voor vasculogenese en angiogenese, en remt daardoor de binding van VEGF aan zijn receptoren.
  - Bevacizumab is onverenigbaar met glucoseoplossingen

Voor meer informatie zie DocPortal.

### Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting - bevacizumab

### Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Zo nodig:
  - Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
  - XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
  - Microlax