

GEMTUZUMAB OZOGAMYCINE compassionate use

Therapielijst/ aftekenlijst/aanvraag cytostatica

Patiëntgegevens:	Datum aanvraag	Afdeling		Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)	
	Code kuur E2:	339966C	chemo acute leukemie	
	Naam + paraaf arts	Naam + paraaf supervisor		
Specialisme: IHMP Indicatie: recidief APL Cyclusduur: 2- 3 weken (afhankelijk bloedbeeld) Totaal: 2-4 Bron: Lo Coco F et al. Blood. 2004 Oct 1;104(7):1995-9	Afspraakcodes DC: Gemtuzumab: 7 uur	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Kuurnummer:

opmerkingen:

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOPTIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW *	DOSIS	POMP- STAND	TIV	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
								a. RR, pols, temp		
			CLEMASTINE	iv	2 mg			bolus		
			PARACETAMOL	p.o	1000 mg					
		00:30						wachten		
		02:00	GEMTUZUMAB 6 mg/m ² t/m 11,7 mg in 50 ml NaCl 0,9% >11,7 mg in 100ml NaCl 0,9%	iv	... mg			In folie 0,22µg filter a. RR, pols, temp		
		04:00						Observatie		
			PARACETAMOL					b.		

Verpleegkundige instructies:

- **a.** Controles vooraf, 1 uur na start en direct na inloop Gemtuzumab ozogamycine.
- **b. Na** overleg met behandelend arts: Zo nodig paracetamol na 4 uur herhalen bij koorts.
- Observeer de patiënt gedurende de aangegeven tijdsduur op infusie gerelateerde bijwerkingen.

patiëntgegevens

Achtergrondinformatie Gemtuzumab ozogamycine compassionate use

Informatie over de behandeling:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl:
- Indicatie: APL
- Evaluatie: bij het bereiken van moleculair remissie start in overleg met arts stamcel transplantatie traject

Informatie over de geneesmiddelen:

- Gemtuzumab
 - Synoniem: Gemtuzumab Ozogamicin (GO), Mylotarg® of anti CD33
 - Eigenschappen: geconjugeerd monoklonaal antilichaam, bestaande uit een monoklonaal antilichaam gekoppeld aan een cytostaticum (anthracycline).

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Gemtuzumab
 - beenmergsuppressie
 - misselijkheid en braken
 - hoofdpijn
 - leverproblemen
 - infusie-gerelateerde bijwerkingen, zoals koude rillingen, koorts, lage bloeddruk en benauwdheid.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- SDD: Ciproxin: 500mg/p.o 2dd
- Fluconazol 500mg/p.o 1dd

Overige informatie:

- Gemtuzumab is 6 uur bij kamertemperatuur houdbaar inclusief toediening.
- Gemtuzumab is lichtgevoelig en moet dus beschermd worden tegen licht gedurende bereiding en toediening. De infuuslijnenhoeven niet tegen licht te worden beschermd.