

Longoncologie behandeling NSCLC pembrolizumab maintenance

maintenance behandeling bij stadium III/IV NSCLC (plaveiselcelcarcinoom) bij een PDL1 van 1-49%.

Eens per 3 weken tot progressie

Na 4 kuren pembrolizumab-carboplatine-paclitaxel.

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: Pembrolizu: 1 uur
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	inlooptijd	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, P, T		
	00:30	PEMBROLIZUMAB In 100 ml NaCl 0,9%		200 mg		0,2 µm filter		

Verpleegkundige toedien-instructies

- observeer op infusiereacties

Achtergrondinformatie NSCLC Pembrolizumab maintenance

Informatie over de kuur:

- Indicatie: palliatief bij niet-kleincellig longcarcinoom, met een PDL1 van 1-49%:
1e lijns behandeling bij stadium III/IV, maintenance behandeling na 4 kuren pembrolizumab-Paclitaxel-Carboplatine.
- Evaluatie: steeds na 2 kuren.

Informatie over de geneesmiddelen:

- **Pembrolizumab:** dit is een gehumaniseerd anti PD-1 monoclonaal antilichaam. Pembrolizumab blokkeert de interactie tussen PD-1 en de liganden PD-L1 en PD-L2. Deze liganden komen vaak tot overexpressie op tumorcellen. Wanneer deze normaal gesproken aan elkaar binden, voorkomt dit activatie van T-cellen. Als pembrolizumab dit blokkeert neemt de activiteit van de lymfocyten toe waardoor ze de tumor kunnen afbreken en zorgen voor afstoting door het immuunsysteem.
Relevante bijwerkingen: Infusiereacties,
Algemene bijwerkingen: vermoeidheid, griep-syndroom, misselijkheid, verminderde eetlust, jeuk, huiduitslag
Diarree, gewrichtspijn, koorts, hypothyreoïdie, pneumonitis.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- DocPortal: Longoncologie – voorlichting – pemetrexed
- Patiënt ontvangt patiënten folder over Pembrolizumab via de poli.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Zo nodig:
Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
Microlax