

DARATUMUMAB, BORTEZOMIB, MELFALAN, PREDNISOLON (1)

Therapielijst/ aftekenlijst/ aanvraag cytostatica

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdeling		Gefaxt naar apotheek Ja/Nee
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)	
	Code kuur E2:	339966F	immuno therapie	
	Naam + paraaf arts		Naam + paraaf supervisor	
Specialisme: IHMP Indicatie: Multipel Myeloom Cyclusduur: 6 weken Totaal: 9 cycli a 6 weken Na 9 kuren over naar 4-wkls DARATUMUMAB monotherapie Bron: SmPC : https://www.cbg-meb.nl/	Afspraakcodes DC: DARA/VMP-K1-D1: Kuur 1, Dag 1: 8,5 uur DARA/VMP-K1-D8: Dag 8: 5,5 uur DARA/VPM-gift 3, 4, 5: 4.45 uur DARA/VPM-snel: Dag 36 en verder: 2.30 uur Bortezomib: K1: Dag 4, 11, 25, 32: 30 min	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....% (vul in percentage en middel)		

Let op: **Opmerkingen:**
Kuur 1

	DAG	GENEESMIDDEL	TW*	DOSIS	TOELICHTING
	2, 3, 4	PREDNISOLON 60 mg/ m2	p.omg	recept arts. Dag 1 dexa iv vooraf aan kuur dan geen prednisolon
	1, 2, 3, 4	MELFALAN 9 mg/m2	p.omg	recept arts.

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOP - TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW*	DOSIS	POMP STAND	TIV	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	1		MONTELUKAST	p.o.	10 mg					
	1		CLEMASTINE	iv	2 mg			bolus		
	1		DEXAMETHASON	iv	20 mg			bolus		
	1		PARACETAMOL	p.o.	1000 mg					
	1							30 min wachten a. RR, pols, temp		
	1	01:00	DARATUMUMAB 16 mg/kg in 1000 ml NaCl 0,9%	iv	... mg	50	50	0,22 µm filter		
		01:00				100	100			
		01:00				150	150			
						200		b. rest		
	1							a. RR, pols, temp		
	1		BORTEZOMIB 1,3 mg/m ² 2,5 mg/ml	SC	... mg			d. in minimaal 5 sec. inspuiten.		
	1							e. MUST		

Verpleegkundige en medische instructies: zie pagina 4

DARATUMUMAB, BORTEZOMIB, MELFALAN, PREDNISOLON (1)

Kuurnummer 1

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	GENEESMIDDEL	TW*	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	4	BORTEZOMIB 1,3 mg/m ² 2,5 mg/ml	SC	... mg	d. in minimaal 5 sec. inspuiten.		
	4				c. bloedsuiker prikken		

DATUM	DAG	INLOOP-TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW*	DOSIS	POMP STAND	TIV	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	8		CLEMASTINE	iv	2 mg			bolus		
	8		DEXAMETHASON	iv	20 mg			bolus		
	8		PARACETAMOL	p.o.	1000 mg					
	8							a. RR, pols, temp		
	8	01:00	DARATUMUMAB 16 mg/kg in 500 ml NaCl 0,9%	iv	... mg	50	50	0,22 µm filter		
		01:00				100	100			
		01:00				150	150			
						200		b. rest		
	8							a. RR, pols, temp		
	8		BORTEZOMIB 1,3 mg/m ² 2,5 mg/ml	SC	... mg			d. in minimaal 5 sec. inspuiten.		

DATUM	DAG	GENEESMIDDEL	TW*	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	11	BORTEZOMIB 1,3 mg/m ² 2,5 mg/ml	SC	... mg	d. in minimaal 5 sec. inspuiten.		
	11				c. bloedsuiker prikken		

DATUM	DAG	INLOOP-TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW*	DOSIS	POMP STAND	TIV	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	15		CLEMASTINE	iv	2 mg			bolus		
	15		DEXAMETHASON	iv	20 mg			bolus		
	15		PARACETAMOL	p.o.	1000 mg					
	15							a. RR, pols, temp		
	15	01:00	DARATUMUMAB 16 mg/kg in 500 ml NaCl 0,9%	iv	... mg	100	100	0,22 µm filter		
		01:00				150	150			
						200		b. rest		
								a. RR, pols, temp		

Verpleegkundige en medische instructies: zie pagina 4.

DARATUMUMAB, BORTEZOMIB, MELFALAN, PREDNISOLON (1)

Kuur 1

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOP-TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW*	DOSIS	POMP STAND	TIV	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2		
	22		CLEMASTINE	iv	2 mg			bolus				
	22		DEXAMETHASON	iv	20 mg			bolus				
	22		PARACETAMOL	p.o.	1000 mg							
	22							a. RR, pols, temp				
	22	01:00	DARATUMUMAB 16 mg/kg in 500 ml NaCl 0,9%	iv	... mg	100	100	0,22 µm filter				
		01:00						150	150			
								200		b. rest		
								a. RR, pols, temp				
	22		BORTEZOMIB 1,3 mg/m ² 2,5 mg/ml	sc	... mg			d. in minimaal 5 sec. inspuiten.				

DATUM	DAG	GENEESMIDDEL	TW*	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	25	BORTEZOMIB 1,3 mg/m ² 2,5 mg/ml	SC	... mg	d. in minimaal 5 sec. inspuiten.		

DATUM	DAG	INLOOP-TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW*	DOSIS	POMP STAND	TIV	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2		
	29		CLEMASTINE	iv	2 mg			bolus				
	29		DEXAMETHASON	iv	20 mg			bolus				
	29		PARACETAMOL	p.o.	1000 mg							
	29							a. RR, pols, temp				
	29	01:00	DARATUMUMAB 16 mg/kg in 500 ml NaCl 0,9%	iv	... mg	100	100	0,22 µm filter				
		01:00						150	150			
								200		b. rest		
								a. RR, pols, temp				
	29		BORTEZOMIB 1,3 mg/m ² 2,5 mg/ml	SCmg			d. in minimaal 5 sec. inspuiten.				

DATUM	DAG	GENEESMIDDEL	TW*	DOSIS	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	32	BORTEZOMIB 1,3 mg/m ² 2,5 mg/ml	SC	... mg	d. in minimaal 5 sec. inspuiten.		

Verpleegkundige en medische instructies: zie pagina 4.

DARATUMUMAB, BORTEZOMIB, MELFALAN, PREDNISOLON (1)

Kuur 1

LET OP: eerste keer versnelde inloop (6 de gift daratumumab)

*TW=toedieningsweg

DATUM	DAG	INLOOP-TIJD (hr:min)	GENEESMIDDEL	TW*	DOSIS	POMP STAND	TIV	TOELICHTING	Paraaf 1	Paraaf 2
	36		CLEMASTINE	iv	2 mg			bolus		
	36		DEXAMETHASON	iv	20 mg			bolus		
	36		PARACETAMOL	p.o.	1000 mg					
	36							a. RR, pols, temp		
	36	00:30	DARATUMUMAB 16 mg/kg in 500 ml NaCl 0,9%	iv	... mg	100	50	0,22 µm filter		
		01:00						rest		
	36							a. RR, pols, temp		

Verpleegkundige instructies:

- a. Controles 5 min voor start en na inloop Daratumumab.
- b.. Inlooptijd afhankelijk van totaalvolume.
- c. Dag 4, 11, bloedsuiker prikken via vingerprik, arts mailen indien glucose 10-13 mmol/l, en bellen indien bloedsuiker > 13 mmol/l.
- d. Injecties moeten op een afstand van tenminste 2,5 cm van een vorige injectieplaats worden toegediend en nooit in gebieden waar de huid pijnlijk, rood of hard is of waar deze blauwe plekken vertoont. Wissel de injectieplaatsen af en noteer injectieplaats in noties in Epic. De naald na het inspuiten van de Bortezomib pas na enkele seconden terugtrekken om teruglopen van de vloeistof te voorkomen.
- e. Screen op ondervoeding: neem op dag 1 de MUST af.
- Observeer tijdens Daratumumab op infusie-gerelateerde reacties.

Medische instructies:

- Voor start van therapie: "uittypering erythrocyten" met onder Medische indicatie benoemen "voor eerste behandeling met Daratumumab".
- Voor patiënten met een risico op respiratoire complicaties (patiënten met astma of COPD) kan de volgende post-infusie-medicatie overwogen worden:
 - Antihistaminicum (clemastine of equivalent)
 - Leukotriënantagonist (montelukast)
 - Kortwerkende Beta-2-mimeticum (b.v. salbutamol inhalatie)
 - Andere inhalatiemedicatie.

Achtergrondinformatie: Daratumumab, Bortezomib, Melfalan, Prednisolon, (1)

Informatie over de behandeling:

- Zie link naar webpagina hematologiegroningen.nl: Multipel myeloom
- Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een autologe stamceltransplantatie.

Informatie over de geneesmiddelen:

- Bortezomib: antineoplastisch middel, cytotoxisch, proteasoomremmer.
 - De behandeling met Bortezomib is zeer vaak geassocieerd met perifere neuropathie. De incidentie van perifere neuropathie stijgt in het begin van de behandeling en is het hoogst tijdens kuur 5. Aanbevolen wordt om patiënten zorgvuldig te controleren op symptomen van neuropathie, zoals een branderig gevoel, hyperesthesie, hypo-esthesie, paresthesie, veranderd gevoel, neuropathische pijn of zwakte. Patiënten met nieuwe of verergerde perifere neuropathie moeten een neurologisch onderzoek ondergaan en het kan nodig zijn de dosis en het toedieningschema van Bortezomib te wijzigen. Bortezomib subcutaan geeft dezelfde resultaten als de intraveneuze behandeling met Bortezomib maar beduidend minder neuropathie.
- Prednisolon:
- Daratumumab (JNJ-54767414): Humaan IgG1k monoklonale antistof gericht tegen CD38.
 - Bijwerkingen: Vermoeidheid, misselijkheid, anemie, rugpijn, neutropenie, hoesten, koorts, trombocytopenie, infecties bovenste luchtwegen, infusie gerelateerde reacties.
 - Door Daratumumab wordt de patiënt 'BIBO' en kan het uitgeven van compatibel bloed langer duren.

Zie verder Doc Portal

Infusie reacties Daratumumab

Infusie reactie bij graad 1 of 2

1. Stop daratumumab infusie en sluit een NaCl 0,9% infuus lijn aan op het kraantje.
2. Waarschuw de behandelend arts en overleg over toedienen medicatie (**let op**: behandeling naar inzicht arts).
3. Na overleg met de behandelend arts, wanneer de patiënt stabiel is, kan infusie worden herstart **op de helft van de snelheid voor onderbreking**.
4. Verdraagt de patiënt dit goed, kan het infuus weer worden opgehoogd volgens schema.

Infusie reactie bij graad 3 of hoger

1. Volg stap 1 t/m 4 zoals bij graad 1 of 2, PLUS:
2. Als na 2 uur nog steeds \geq graad 3; stop behandeling.
3. Mocht er na herstel opnieuw een reactie optreden, mag het stappenplan nogmaals doorlopen worden. Bij een derde reactie wordt de behandeling gestaakt.

NB:

De meeste infusiegerelateerde reacties zijn waar te nemen in het hoofd-halsgebied.

Bijna alles is GR1 of 2 en betreft voornamelijk voorste luchtweg problemen en is goed te verhelpen met wat tavegil.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Patiënten worden door arts ingelicht.

Voorlichting benadrukt door verpleegkundige van het dagcentrum:

- Bortezomib: Instrueer de patiënt symptomen van neuropathie te melden bij de arts.

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Zo nodig Allopurinol / rehydratie
- PCP profylaxe: geen
- Profylaxe heractivatie herpes: valaciclovir 500mg 2dd
- Profylaxe luchtweg infectie: ciproxin 500mg 2dd
- Bisfosfonaten