

**Longoncologie behandeling SCLC Rova T compassionate use.**  
**(Rovalpituzumab tesirine)**  
 2 kuren à 6 weken tot progressie

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: Rova-Tesirine : 105 min
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring	..... ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m <sup>2</sup> )
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

**Compassionate use nummer: .....**

**NB : dag -1, dag 1 en dag 2 dexamethason 2 x dd 8 mg per os.**

**Op de dag van de Rovalpituzumab moet de dexamethason tussen 30 minuten en vier uur voor de Rovalpituzumab ingenomen worden.**

**Als er geen Dexamethason geslikt is, mag de Rovalpituzumab niet gegeven worden!**

datum	inlooptijd	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
	00:30	<b>ROVALPITUZUMAB tesirine</b> in 50-100 ml NaCl 0,9% <b>compassionate use</b>	0.3 mg/kg			0,2 µm filter		
						<b>30 min.observatie</b> RR, pols, temp		

**Verpleegkundige toedien-instructies**

- Observeer op infusiereacties.
- Adviseer patiënten: Vermijd onbeschermd zonnen, tot 30 dagen na toediening rovalpituzumab.

# Achtergrondinformatie Rovalpituzumab Tesirine

## Informatie over de kuur:

- Indicatie: tweedelijns behandeling bij SCLC.

## Informatie over het geneesmiddel:

- Rovalpituzumab tesirine (Rova-T) is een gehumaniseerd DDL3-specifiek IgG1 monoclaal antilichaam dat het immuunsysteem aanzet om de kankercellen te bestrijden.
- Relevante bijwerkingen: moeheid, pleuravocht, perifeer oedeem, thrombopenie en huidreacties

## Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Patiënt ontvangt patiënten folder over Rovalpituzumab (Rova-T) via de poli.  
gebruik van sterke CYP3A4 remmers dient vermeden te worden (pyrrolbenzodiazepine is een substraat van CYP3A4).