

**Longoncologie behandeling NSCLC studies CANOPY-1 randomizd part
12NAT02374**

canakinumab/placebo-pembrolizumab-maintenance
maintenance behandeling bij stadium III/IV NSCLC (*Plaveiselcelcarcinoom*)
Na 4 kuren canakinumab-pembrolizumab-carboplatine-paclitaxel.

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: CANOPY-CANA/PEMBRO/CARBO: 2 UUR
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	Chemo-immunotherapie
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	inlooptijd	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, pols, temp		
		CANAKINUMAB/placebo let op: studieaanvraag nodig Komt uit apotheek OKO, via EPIC aanvragen!		200 mg		s.c.		
	00:30					wachten		
	00:30	PEMBROLIZUMAB In 100 ml NaCl 0,9% let op: studieaanvraag nodig		200 mg		0,2 µm filter		

Verpleegkundige toedien-instructies

- Check of de patiënt de avond van te voren 8 mg dexamethason heeft ingenomen.
- Observeer tijdens toediening op overgevoeligheidsreacties.

Achtergrondinformatie CANOPY studie Canakinumab-Pembrolizumab

Informatie over de kuur:

- CANOPY: een gerandomiseerd, dubbelblind placebo-gecontroleerde fase III onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van pembrolizumab plus platinum-gebaseerde doublet-chemotherapie met of zonder Canakinumab. Runin fase altijd Canakinumab, in de gerandomiseerde dubbelblinde fase Canakinumab/ placebo
- Indicatie: palliatief bij niet-kleincellig longcarcinoom, 1e lijns behandeling bij stadium III/IV

Informatie over de geneesmiddelen:

- **Canakinumab:** Canakinumab gaat de werking tegen van een lichaamseiwit, interleukine-1 bèta (afgekort IL-1B). IL-1B speelt mogelijk een belangrijke rol bij het afremmen van immuuntherapie. Uit eerdere onderzoeken met canakinumab is gebleken dat het remmen van bepaalde ontstekingsprocessen gunstig kan zijn voor de behandeling van kanker met immuuntherapie. Canakinumab is een geregistreerd geneesmiddel voor de behandeling van diverse ontstekingsziekten.
Mogelijke bijwerkingen: Luchtweginfecties, virusinfectie (verkoudheid of griep), urineweginfectie, oorontsteking, pneumonie, angina, maagdarminfectie, schimmelinfectie van de vagina, pijn in de bovenbuik, diarree, misselijkheid, gewichtstoename, pijn in botten, spieren en gewrichten, hoofdpijn, duizeligheid, leukopenie, thrombopenie, anemie
- **Pembrolizumab:** dit is een gehumaniseerd anti PD-1 monoclonaal antilichaam. Pembrolizumab blokkeert de interactie tussen PD-1 en de liganden PD-L1 en PD-L2. Deze liganden komen vaak tot overexpressie op tumorcellen. Wanneer deze normaal gesproken aan elkaar binden, voorkomt dit activatie van T-cellen. Als pembrolizumab dit blokkeert neemt de activiteit van de lymfocyten toe waardoor ze de tumor kunnen afbreken en zorgen voor afstoting door het immuunsysteem.
Relevante bijwerkingen: Infusiereacties,
Algemene bijwerkingen: vermoeidheid, griep-syndroom, misselijkheid, verminderde eetlust, jeuk, huiduitslag
Diarree, gewrichtspijn, koorts, hypothyreoïdie, pneumonitis.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

- Patiënt ontvangt patiënten folder over Pembrolizumab via de poli.
- Studie-informatie via researchverpleegkundigen

Co-medicatie - recepten via arts (geen EVS)

- Anti-emetica zie pagina 1
- geen NSAID's 2 dagen voor tot en met 2 dagen na de Pemetrexed. NSAID's staken bij kreat klaring < 35 ml/min.
- Zo nodig:
Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
Microlax
- Foliumzuur 1x dd 0.5 mg en vitamine B12 1000 µg 1x/6 weken

Contact:

- PI: dr. T.J.N. Hiltermann
- Research verpleegkundige: Fleur Souari (47012)

Controlelijst: CANOPY studie Canakinumab-Pembrolizumab


Kuur:.....

Datum:.....

Sticker patiëntgegevens

Toediening injectie:

Tijdstip toediening Canakinumab	Bijzonderheden
Spuit 1	
Spuit 2	



Geef prikplaats aan in afbeelding

Start- en stoptijden medicatie:

Middel	Starttijd	Stoptijd	Bijzonderheden
Pembrolizumab			

Controles:

	Tijdstip	RR	Pols	AH	Temp	Bloed-afname	Paraaf
Voor start						Research verpleegkundige	
Na toediening							