

Longoncologie behandeling SCLC atezolizumab maintenance compassionate use

1^e lijn bij SCLC ED. Na 4 kuren Atezolizumab-Carboplatine-Etoposide, maintenance behandeling à 3 weken.

Kuur/cyclus:

Patiëntsticker:	Datum aanvraag	Afdelingscode	Afspraakcode dagcentrum: Atezo-maintenance
	Dosisreductie: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja:.....%		
	Kreatinineklaring ml/min	
	Lengte (cm)	Gewicht (kg)	Lich.opp (m ²)
	Toedieningswijze	IV, tenzij anders vermeld	
		339966F	chemo gemetastaseerd
	Naam + paraaf arts		
	Gefaxt/gescand	Paraaf:	

datum	inlooptijd	geneesmiddel	dosering	dosis	pompstand	toelichting	Par.1	Par.2
						RR, P, T		
	00.30	ATEZOLIZUMAB In 250 ml NaCl 0,9% Compassionate use		1200 mg				

Verpleegkundige toedien-instructies:

- Observeer op overgevoeligheidsreacties
- Anti-emetica thuisadvies:
- zo nodig metoclopramide 3 dd 10 mg p.o. of 10 mg supp.

Achtergrondinformatie SCLC Atezolizumab (compassionate use)

Informatie over de kuur:

- Indicatie: onderhoudsbehandeling bij extensive disease kleincellig longcarcinoom, na 4 kuren atezolizumab-carboplatine-etoposide à 3 weken
- **Informatie over de geneesmiddel:**

Atezolizumab:

- Immunotherapie. Monoclaal antilichaam dat aan het PDL-1 eiwit bindt. PDL-1 is een extracellulair eiwit dat de immuunrespons verlaagt. Binding van PDL-1 kan een actieve strategie zijn om de tumorspecifieke T-cell immuunrespons te activeren. De hypothese is dat toevoeging van de chemotherapie aan de atezolizumab de immuunrespons kan vergroten.

Voor meer informatie zie DocPortal.

Informatie voor patiënten over bijwerkingen:

DocPortal: Longoncologie – voorlichting - en folder Atezolizumab

Co-medicatie

- Anti-emetica zie pagina 1

Zo nodig:

- Movicolon 1 – 2 x daags 1 sachet
- XPrep 1 – 3 x daags 10 ml
- Microlax